



À : **TOUS LES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS**
De : **Comité national d'urgence pour la gestion des réserves de sang***
Objet : **PHASE VERTE NORMALE**

État des réserves nationales

Date et heure d'émission	2022-12-22 0600 (HE)
Phase	PHASE VERTE NORMALE
Produit(s)	Composants sanguins labiles
Description	<p>Les niveaux des réserves sont en phase verte pour tous les composants sanguins labiles.</p> <p>Toutefois les réserves ne sont pas à leur niveau optimal en raison d'une diminution du volume des collectes ces dernières semaines (annulations de rendez-vous, donneurs ajournés, conditions météorologiques), ce qui entraîne une fluctuation du niveau des réserves dans certaines régions. Bien que le nombre de dons ait augmenté récemment, cela est mitigé par les conditions météorologiques dans bon nombre de régions à l'échelle du pays. Cette situation pourrait perdurer jusqu'au début du mois de janvier. Le transport des composants sanguins pourrait également être perturbé, ce qui pourrait également affecter les réserves.</p> <p>Bien que les réserves de CGR du groupe O- soient pour l'instant les plus touchées, celles des autres groupes le sont également.</p> <p>Le CNUGRS surveille étroitement la situation. Le présent avis a uniquement pour but de vous informer de la situation.</p>
Conséquences pour les hôpitaux	<p><u>Actions requises</u></p> <p>Compte tenu du caractère fluctuant du volume des collectes et des réserves, nous vous recommandons d'appliquer les bonnes pratiques en matière d'utilisation des composants sanguins labiles. Si vos besoins ou vos réserves venaient à évoluer, n'hésitez pas à contacter votre agent de liaison à la Société canadienne du sang.</p> <p>CGR O- Veuillez vous assurer que les bonnes pratiques en matière d'utilisation des CGR O- soient appliquées en tout temps, comme cela est décrit dans la déclaration du CCN pour la gestion et l'utilisation des réserves de culots globulaires du groupe O RhD négatif.</p> <p>CGR (tous groupes confondus) Par ailleurs, le CNUGRS recommande d'appliquer les bonnes pratiques suivantes concernant l'ensemble des CGR : Transfuser avec soin – Critères de référence pour les transfusions de culots globulaires</p>

	<p>Recommandations pour une utilisation appropriée des CGR de rhésus négatif, TOUS GROUPES CONFONDUS</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="375 197 1585 243"> <p>Indications obligatoires : toujours utiliser du CGR de rhésus négatif</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="375 243 1585 373"> <ul style="list-style-type: none"> • Personnes en âge de procréer (45 ans ou moins) de rhésus négatif • Personnes possédant un anti-D allogénique </td> </tr> <tr> <td data-bbox="375 373 1585 464"> <p>Indications hautement recommandées : si possible, utiliser du CGR de rhésus négatif</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="375 464 1585 604"> <ul style="list-style-type: none"> • Personnes de rhésus négatif (tous âges confondus) devant, ou susceptibles de, recevoir des transfusions régulières de CGR (p. ex. personnes souffrant d'hémoglobinopathies) </td> </tr> <tr> <td data-bbox="375 604 1585 730"> <p>Indications acceptables : l'utilisation de CGR de rhésus négatif est acceptable, mais préférer du CGR de rhésus positif si les réserves de CGR de rhésus négatif sont très limitées</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="375 730 1585 810"> <ul style="list-style-type: none"> • Personnes de rhésus négatif n'étant pas en âge de procréer et ne nécessitant pas la transfusion d'un large volume de sang </td> </tr> <tr> <td data-bbox="375 810 1585 898"> <p>Indications probablement inacceptables si les réserves de CGR de rhésus négatif sont limitées</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="375 898 1585 999"> <ul style="list-style-type: none"> • Personnes de rhésus négatif ne possédant pas d'anti-D allogénique et n'étant pas en âge de procréer nécessitant la transfusion d'un large volume de sang (plus de 4-6 unités) </td> </tr> </table>	<p>Indications obligatoires : toujours utiliser du CGR de rhésus négatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Personnes en âge de procréer (45 ans ou moins) de rhésus négatif • Personnes possédant un anti-D allogénique 	<p>Indications hautement recommandées : si possible, utiliser du CGR de rhésus négatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Personnes de rhésus négatif (tous âges confondus) devant, ou susceptibles de, recevoir des transfusions régulières de CGR (p. ex. personnes souffrant d'hémoglobinopathies) 	<p>Indications acceptables : l'utilisation de CGR de rhésus négatif est acceptable, mais préférer du CGR de rhésus positif si les réserves de CGR de rhésus négatif sont très limitées</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Personnes de rhésus négatif n'étant pas en âge de procréer et ne nécessitant pas la transfusion d'un large volume de sang 	<p>Indications probablement inacceptables si les réserves de CGR de rhésus négatif sont limitées</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Personnes de rhésus négatif ne possédant pas d'anti-D allogénique et n'étant pas en âge de procréer nécessitant la transfusion d'un large volume de sang (plus de 4-6 unités)
<p>Indications obligatoires : toujours utiliser du CGR de rhésus négatif</p>									
<ul style="list-style-type: none"> • Personnes en âge de procréer (45 ans ou moins) de rhésus négatif • Personnes possédant un anti-D allogénique 									
<p>Indications hautement recommandées : si possible, utiliser du CGR de rhésus négatif</p>									
<ul style="list-style-type: none"> • Personnes de rhésus négatif (tous âges confondus) devant, ou susceptibles de, recevoir des transfusions régulières de CGR (p. ex. personnes souffrant d'hémoglobinopathies) 									
<p>Indications acceptables : l'utilisation de CGR de rhésus négatif est acceptable, mais préférer du CGR de rhésus positif si les réserves de CGR de rhésus négatif sont très limitées</p>									
<ul style="list-style-type: none"> • Personnes de rhésus négatif n'étant pas en âge de procréer et ne nécessitant pas la transfusion d'un large volume de sang 									
<p>Indications probablement inacceptables si les réserves de CGR de rhésus négatif sont limitées</p>									
<ul style="list-style-type: none"> • Personnes de rhésus négatif ne possédant pas d'anti-D allogénique et n'étant pas en âge de procréer nécessitant la transfusion d'un large volume de sang (plus de 4-6 unités) 									
<p>Complément d'information</p>	<p>Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'agent de liaison de la Société canadienne du sang; 2. votre représentant au Comité provincial/territorial d'urgence pour la gestion du sang; 3. votre représentant au comité hospitalier d'urgence pour la gestion du sang. 								

*Le Comité national d'urgence pour la gestion des réserves de sang (CNUGRS) est constitué de représentants du Comité consultatif national sur le sang et les produits sanguins (CCN), du Comité de liaison provincial-territorial et de membres du personnel de la Société canadienne du sang. Il formule des recommandations et conseille les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé, les hôpitaux et les autorités régionales de la santé, de même que la Société canadienne du sang, pour favoriser une réponse uniforme et coordonnée en cas de grave pénurie de sang au Canada.

Pour en savoir plus sur le Plan national de gestion en cas de pénuries de composants sanguins labiles, consultez la page suivante : [Pénurie de sang | Comité consultatif national sur le sang et les produits sanguins \(nacblood.ca/fr\)](#). Si vous souhaitez obtenir le présent avis dans un format accessible, communiquez avec l'agent de liaison de la Société canadienne du sang de votre région.