



À : TOUS LES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS
De : Comité national d'urgence pour la gestion des réserves de sang (CNUGRS)*
Objet : PHASE VERTE (niveau normal)

Avis sur l'état des réserves nationales — dernières nouvelles

Date et heure d'émission	2023-05-18 06:00 (HNE)
Phase	PHASE VERTE (niveau normal)
Produit(s)	Culots globulaires
Contexte	<p>Le niveau des réserves de culots globulaires de tous les groupes sanguins est en phase verte.</p> <p>Bien que les niveaux des réserves de culots globulaires des groupes O- et B- se soient améliorés, ils demeurent en dessous des niveaux optimaux, notamment celui des réserves de culots globulaires O-.</p> <p>En prévision du long week-end à venir et de ses éventuelles répercussions sur les besoins des hôpitaux, des mesures additionnelles, notamment la mobilisation des réserves nationales, sont en cours de déploiement. <u>Il se pourrait</u> que les hôpitaux observent une réduction ponctuelle de leurs réserves, mais cela ne sera que très temporaire. Si c'est le cas, veuillez contacter la Société canadienne du sang rapidement afin de reconstituer vos réserves.</p> <p>Le présent avis ne vise qu'à sensibiliser les hôpitaux à la réalité actuelle.</p>
Conséquences sur les hôpitaux	<p><u>Action requise</u></p> <p>En attendant que les réserves de culots globulaires O- et B- soient complètement reconstituées, nous recommandons aux hôpitaux de maintenir les niveaux habituels de leurs réserves et d'appliquer les bonnes pratiques en matière d'utilisation des composants sanguins labiles. Pour plus d'informations sur les collectes organisées dans votre région, allez au www.sang.ca.</p> <p>Si votre hôpital observe des changements dans la demande de composants sanguins labiles (augmentation du nombre de patients aux besoins élevés) ou connaît des problèmes de stocks, veuillez contacter l'agent(e) de liaison de la Société canadienne du sang. Les hôpitaux et les provinces devraient profiter de l'occasion pour se familiariser avec les plans prévus en cas de pénurie de sang, au cas où ils devraient informer le CNUGRS d'une situation locale par l'intermédiaire de leurs représentants provinciaux.</p> <p>Culots globulaires O- Nous demandons aux hôpitaux de continuer d'appliquer en tout temps les bonnes pratiques définies dans le document <i>du Comité consultatif national sur le sang et les produits sanguins intitulé Gestion et utilisation des réserves de culots globulaires du groupe O RhD négatif</i>.</p>

	<p>Culots globulaires B- Nous demandons aux hôpitaux de réévaluer leurs réserves de culots globulaires B- et d'informer les équipes cliniques concernées de cet avis pour faciliter la planification des transfusions (p. ex. pour les patients atteints d'anémie falciforme nécessitant d'importants volumes de CGR).</p> <p>Tous groupes confondus Le CNUGRS recommande d'appliquer les bonnes pratiques suivantes pour les culots globulaires de tous les groupes sanguins : Transfuser avec soin – Critères de référence pour les transfusions de culots globulaires.</p> <p>Recommandations pour une utilisation appropriée des culots RhD négatif, TOUS GROUPES CONFONDUS</p> <table border="1" data-bbox="418 562 1513 1360"> <tr> <td data-bbox="418 562 1513 611">Indications obligatoires : toujours utiliser des culots RhD négatif</td> </tr> <tr> <td data-bbox="418 611 1513 730"> <ul style="list-style-type: none"> • Personnes en âge de procréer (45 ans et moins) RhD négatif • Personnes possédant un anti-D allogénique </td> </tr> <tr> <td data-bbox="418 730 1513 779">Indications hautement recommandées : si possible, utiliser des culots RhD négatif</td> </tr> <tr> <td data-bbox="418 779 1513 919"> <ul style="list-style-type: none"> • Personnes RhD négatif (tous âges confondus) devant recevoir des transfusions régulièrement (p. ex. personnes souffrant d'hémoglobinopathies) </td> </tr> <tr> <td data-bbox="418 919 1513 1024">Indications généralement acceptables : l'utilisation de culots RhD négatif est acceptable, mais préférer des culots RhD positif si les réserves de culots RhD négatif sont très limitées</td> </tr> <tr> <td data-bbox="418 1024 1513 1129"> <ul style="list-style-type: none"> • Personnes RhD négatif n'étant pas en âge de procréer et ne nécessitant pas la transfusion d'un grand volume de sang </td> </tr> <tr> <td data-bbox="418 1129 1513 1220">Indications probablement inacceptables : l'utilisation de culots RhD négatif est probablement inacceptable si les réserves de culots RhD sont limitées</td> </tr> <tr> <td data-bbox="418 1220 1513 1360"> <ul style="list-style-type: none"> • Personnes RhD négatif ne possédant pas d'anti-D allogénique et n'étant pas en âge de procréer nécessitant la transfusion d'un large volume de sang (plus de 4-6 unités) </td> </tr> </table>	Indications obligatoires : toujours utiliser des culots RhD négatif	<ul style="list-style-type: none"> • Personnes en âge de procréer (45 ans et moins) RhD négatif • Personnes possédant un anti-D allogénique 	Indications hautement recommandées : si possible, utiliser des culots RhD négatif	<ul style="list-style-type: none"> • Personnes RhD négatif (tous âges confondus) devant recevoir des transfusions régulièrement (p. ex. personnes souffrant d'hémoglobinopathies) 	Indications généralement acceptables : l'utilisation de culots RhD négatif est acceptable, mais préférer des culots RhD positif si les réserves de culots RhD négatif sont très limitées	<ul style="list-style-type: none"> • Personnes RhD négatif n'étant pas en âge de procréer et ne nécessitant pas la transfusion d'un grand volume de sang 	Indications probablement inacceptables : l'utilisation de culots RhD négatif est probablement inacceptable si les réserves de culots RhD sont limitées	<ul style="list-style-type: none"> • Personnes RhD négatif ne possédant pas d'anti-D allogénique et n'étant pas en âge de procréer nécessitant la transfusion d'un large volume de sang (plus de 4-6 unités)
Indications obligatoires : toujours utiliser des culots RhD négatif									
<ul style="list-style-type: none"> • Personnes en âge de procréer (45 ans et moins) RhD négatif • Personnes possédant un anti-D allogénique 									
Indications hautement recommandées : si possible, utiliser des culots RhD négatif									
<ul style="list-style-type: none"> • Personnes RhD négatif (tous âges confondus) devant recevoir des transfusions régulièrement (p. ex. personnes souffrant d'hémoglobinopathies) 									
Indications généralement acceptables : l'utilisation de culots RhD négatif est acceptable, mais préférer des culots RhD positif si les réserves de culots RhD négatif sont très limitées									
<ul style="list-style-type: none"> • Personnes RhD négatif n'étant pas en âge de procréer et ne nécessitant pas la transfusion d'un grand volume de sang 									
Indications probablement inacceptables : l'utilisation de culots RhD négatif est probablement inacceptable si les réserves de culots RhD sont limitées									
<ul style="list-style-type: none"> • Personnes RhD négatif ne possédant pas d'anti-D allogénique et n'étant pas en âge de procréer nécessitant la transfusion d'un large volume de sang (plus de 4-6 unités) 									
COMPLÉMENT D'INFORMATION	<p>Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. votre agent(e) de liaison de la Société canadienne du sang; 2. votre représentant(e) au Comité provincial d'urgence pour la gestion du sang; 3. votre représentant(e) au comité hospitalier d'urgence pour la gestion du sang. 								

* Le Comité national d'urgence pour la gestion des réserves de sang est constitué de représentants du Comité consultatif national sur le sang et les produits sanguins et du Comité de liaison provincial-territorial ainsi que de membres clés du personnel de la Société canadienne du sang. Il formule des recommandations et conseille les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé, les hôpitaux et les autorités régionales de la santé, de même que la Société canadienne du sang, pour favoriser une réponse uniforme et coordonnée en cas de grave pénurie de sang au Canada.

Pour en savoir plus sur le Plan national de gestion en cas de pénuries de composants sanguins labiles, consultez le site suivant : [Pénurie de sang | Comité consultatif national sur le sang et les produits sanguins \(CCN\) \(nacblood.ca/fr\)](#). Si vous souhaitez obtenir le présent avis dans un format accessible, communiquez avec l'agent de liaison avec les hôpitaux de la Société canadienne du sang de votre région.