

À : TOUS LES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS
De : Comité national d'urgence pour la gestion des réserves de sang (CNUGRS)*
Objet : PHASE VERTE (niveau normal)

Avis sur l'état des réserves nationales — dernières nouvelles

Date et heure d'émission	2023-05-05 0600 (HNE)
Phase	PHASE VERTE (niveau normal)
Produit(s)	Culots globulaires
Contexte	<p>Le niveau des réserves de culots de tous les groupes sanguins est en phase verte.</p> <p>Cependant, les stocks demeurent inférieurs à la normale et la réponse aux messages de besoins immédiats est plus faible qu'à l'habitude. Les effets de cette situation se font surtout sentir sur les réserves de culots globulaires des groupes O- et B-.</p> <p>Des mesures additionnelles, notamment la mobilisation des stocks nationaux, sont en cours de déploiement. <u>Il se pourrait</u> que les hôpitaux observent une réduction ponctuelle de leurs commandes locales, mais cela ne sera que très temporaire.</p> <p>Le CNUGRS s'est réuni et suit la situation de près. Le présent avis ne vise qu'à sensibiliser les hôpitaux à la réalité actuelle.</p>
Conséquences sur les hôpitaux	<p><u>Action requise</u></p> <p>On recommande aux hôpitaux de maintenir les niveaux de stocks habituels, de suivre les meilleures pratiques et d'utiliser les composants sanguins labiles judicieusement. Des informations sur les possibilités de don de sang à l'échelle locale sont disponibles au www.sang.ca.</p> <p>Si votre hôpital observe des changements dans la demande de composants sanguins labiles (augmentation du nombre de patients aux besoins élevés) ou connaît des problèmes de stocks, veuillez contacter votre agent(e) de liaison de la Société canadienne du sang. Les hôpitaux et les provinces devraient profiter de l'occasion pour se familiariser avec les plans prévus en cas de pénurie de sang, au cas où ils devraient informer le CNUGRS d'une situation locale par l'intermédiaire de leurs représentants provinciaux.</p> <p>Culots O- Nous demandons aux hôpitaux de continuer à respecter en tout temps les pratiques exemplaires définies dans le document du Comité consultatif national sur le sang et les produits sanguins intitulé Gestion et utilisation des réserves de culots globulaires du groupe O RhD négatif.</p> <p>Culots B- Nous demandons aux hôpitaux de réévaluer leurs stocks de culots B- et d'informer les équipes cliniques concernées de cet avis pour faciliter la planification des</p>

	<p>transfusions (par exemple, chez les patients atteints de drépanocytose dont le volume échangé est élevé).</p> <p>Tous les culots Le CNUGRS recommande d'appliquer les pratiques exemplaires suivantes pour les culots de tous les groupes sanguins : Transfuser avec soin – Critères de référence pour les transfusions de culots globulaires.</p> <p>Recommandations pour une utilisation appropriée des culots RhD négatif, TOUS GROUPES CONFONDUS</p> <table border="1" data-bbox="418 464 1516 1272"> <tr> <td data-bbox="418 464 1516 512">Indications obligatoires : toujours utiliser des culots RhD négatif</td> </tr> <tr> <td data-bbox="418 512 1516 638"> <ul style="list-style-type: none"> • Personnes en âge de procréer (45 ans et moins) RhD négatif • Personnes possédant un anti-D allogénique </td> </tr> <tr> <td data-bbox="418 638 1516 699">Indications hautement recommandées : si possible, utiliser des culots RhD négatif</td> </tr> <tr> <td data-bbox="418 699 1516 825"> <ul style="list-style-type: none"> • Personnes RhD négatif (tous âges confondus) devant recevoir des transfusions régulièrement (p. ex. personnes souffrant d'hémoglobinopathies) </td> </tr> <tr> <td data-bbox="418 825 1516 951">Indications généralement acceptables : l'utilisation de culots RhD négatif est acceptable, mais préférer des culots RhD positif si les réserves de culots RhD négatif sont très limitées</td> </tr> <tr> <td data-bbox="418 951 1516 1066"> <ul style="list-style-type: none"> • Personnes RhD négatif n'étant pas en âge de procréer et ne nécessitant pas la transfusion d'un grand volume de sang </td> </tr> <tr> <td data-bbox="418 1066 1516 1161">Indications probablement inacceptables : l'utilisation de culots RhD négatif est probablement inacceptable si les réserves de culots RhD sont limitées</td> </tr> <tr> <td data-bbox="418 1161 1516 1272"> <ul style="list-style-type: none"> • Personnes RhD négatif ne possédant pas d'anti-D allogénique et n'étant pas en âge de procréer nécessitant la transfusion d'un large volume de sang (plus de 4-6 unités) </td> </tr> </table>	Indications obligatoires : toujours utiliser des culots RhD négatif	<ul style="list-style-type: none"> • Personnes en âge de procréer (45 ans et moins) RhD négatif • Personnes possédant un anti-D allogénique 	Indications hautement recommandées : si possible, utiliser des culots RhD négatif	<ul style="list-style-type: none"> • Personnes RhD négatif (tous âges confondus) devant recevoir des transfusions régulièrement (p. ex. personnes souffrant d'hémoglobinopathies) 	Indications généralement acceptables : l'utilisation de culots RhD négatif est acceptable, mais préférer des culots RhD positif si les réserves de culots RhD négatif sont très limitées	<ul style="list-style-type: none"> • Personnes RhD négatif n'étant pas en âge de procréer et ne nécessitant pas la transfusion d'un grand volume de sang 	Indications probablement inacceptables : l'utilisation de culots RhD négatif est probablement inacceptable si les réserves de culots RhD sont limitées	<ul style="list-style-type: none"> • Personnes RhD négatif ne possédant pas d'anti-D allogénique et n'étant pas en âge de procréer nécessitant la transfusion d'un large volume de sang (plus de 4-6 unités)
Indications obligatoires : toujours utiliser des culots RhD négatif									
<ul style="list-style-type: none"> • Personnes en âge de procréer (45 ans et moins) RhD négatif • Personnes possédant un anti-D allogénique 									
Indications hautement recommandées : si possible, utiliser des culots RhD négatif									
<ul style="list-style-type: none"> • Personnes RhD négatif (tous âges confondus) devant recevoir des transfusions régulièrement (p. ex. personnes souffrant d'hémoglobinopathies) 									
Indications généralement acceptables : l'utilisation de culots RhD négatif est acceptable, mais préférer des culots RhD positif si les réserves de culots RhD négatif sont très limitées									
<ul style="list-style-type: none"> • Personnes RhD négatif n'étant pas en âge de procréer et ne nécessitant pas la transfusion d'un grand volume de sang 									
Indications probablement inacceptables : l'utilisation de culots RhD négatif est probablement inacceptable si les réserves de culots RhD sont limitées									
<ul style="list-style-type: none"> • Personnes RhD négatif ne possédant pas d'anti-D allogénique et n'étant pas en âge de procréer nécessitant la transfusion d'un large volume de sang (plus de 4-6 unités) 									
COMPLÉMENT D'INFORMATION	<p>Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. votre agent(e) de liaison de la Société canadienne du sang; 2. votre représentant(e) au Comité provincial d'urgence pour la gestion du sang; 3. votre représentant(e) au comité hospitalier d'urgence pour la gestion du sang. 								

* Le Comité national d'urgence pour la gestion des réserves de sang est constitué de représentants du Comité consultatif national sur le sang et les produits sanguins et du Comité de liaison provincial-territorial ainsi que de membres du personnel clés de la Société canadienne du sang. Il formule des recommandations et conseille les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé, les hôpitaux et les autorités régionales de la santé, de même que la Société canadienne du sang, pour favoriser une réponse uniforme et coordonnée en cas de grave pénurie de sang au Canada.

Pour en savoir plus sur le Plan national de gestion en cas de pénuries de composants sanguins labiles, consultez le site suivant : [Pénurie de sang | Comité consultatif national sur le sang et les produits sanguins \(CCN\) \(nacblood.ca/fr\)](#). Si vous souhaitez obtenir le présent avis dans un format accessible, communiquez avec l'agent de liaison avec les hôpitaux de la Société canadienne du sang de votre région.